

Linco - Si



Síntesis

600 mg / 2 ml / 300 mg / ml

SOLUCIÓN INYECTABLE I.M. / I.V

Composición:

Cada 2 ml contiene:

Lincomicina Clorhidrato.....600 mg
Vehículo c.s.p. 2 ml

Composición:

Cada ml contiene:

Lincomicina Clorhidrato.....300 mg
Vehículo c.s.p. 1 ml

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Linco - Si es un antibiótico eficaz contra los gérmenes grampositivos como: Staphylococcus, Pneumococcus y Streptococcus. Esta penetra en buenas concentraciones a los compartimientos líquidos intracelulares y en casi todos los tejidos. No presenta resistencia cruzada, excepto con clindamicina y con eritromicina.-

INDICACIONES:

Infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto respiratorio inferior, incluye bronquitis aguda, bronquitis crónica y neumonía. Infecciones cutáneas y de tejido blando, incluyen celulitis, furúnculos, absceso, impétigo, acné y heridas infectadas (septicemia). Los padecimientos tales como erisipela, paroniquia (panadizo), mastitis y gangrena cutánea responderán a la terapia con **Linco - Si** si son causadas por organismos susceptibles. Infecciones óseas, osteomielitis, fiebre escarlatina y otitis media, amigdalitis, sinusitis, artritis séptica.

CONTRAINDICACIONES:

Linco - Si está contraindicada en pacientes que previamente han demostrado sensibilidad a la Lincomicina o a la clindamicina. No debe administrarse durante el embarazo a menos que su utilización se considere indispensable. No debe administrarse en niños menores de un mes, ni en infección por monilia, ni en casos de disfunción renal aguda.-

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Linco - Si, debe administrarse con precaución a pacientes con antecedentes de enfermedades gastrointestinales, especialmente colitis pseudomembranosa. Aunque parece que la Lincomicina se espasa en el líquido cefalorraquídeo, los niveles de Lincomicina en dicho líquido puede ser inadecuado para el tratamiento de meningitis, por lo que este fármaco no deberá usarse en el tratamiento de dicha enfermedad. Se ha demostrado in vitro antagonismo entre la Lincomicina y la eritromicina, debido a la importancia clínica estos dos medicamentos no deben administrarse conjuntamente. Si la terapia antibiótica con **Linco - Si** es prolongada, se deben realizar pruebas de las funciones hepática y renal. **Linco - Si** no debe inyectarse por vía IV. en forma de dosis masiva, sino que debe administrarse en forma de infusión tal se describe en la sección de posología y administración.

EFFECTOS ADVERSOS:

Gastrointestinales: náuseas, vómitos, malestar abdominal y diarrea persistente. Se ha informado de reacciones de hipersensibilidad, tales como edema angioneurótico, enfermedad del suero y anafilaxis, alguna de estas en pacientes sensibles a la penicilina. En raras ocasiones, eritema multiforme, algunas reacciones parecidas al síndrome Steven-Johnson, han sido asociadas con la administración de **Linco - Si**. Piel y mucosa: Prurito, erupciones cutáneas, urticaria, vaginitis y en raras ocasiones se ha informado de dermatitis exfoliativa y vesiculopapular.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Bloqueantes neuromusculares, drogas antidiarreicas tales como el caolín que es capaz de disminuir la absorción intestinal de **Linco - Si**. Antibióticos de amplio espectro, como la eritromicina no deben asociarse con **Linco - Si**. No deberá administrarse en soluciones que contengan novobiocina, kanamicina y fenitoína.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

En caso de una sobredosis o de las reacciones tóxicas como colitis pseudomembranosa, problemas de hipotensión arterial y síncope, el tratamiento debe ser sintomático y de soporte, ya que no existe un antidoto específico.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN:

Adultos: inyección intramuscular. Infecciones graves, 600 mg cada 12 a 24 horas (o más frecuentemente), como lo requiere la gravedad de la infección. Infusión intravenosa: (Ver tasa de dilución e infusión). Infecciones graves, 600 mg a 1 gramo cada 8 a 12 horas; esta dosis se puede aumentar en caso de infecciones más graves. En situaciones que amenazan la vida, se han administrado hasta 8 gramos al día por vía IV. Niños: Inyección IM: Infecciones graves, 10 mg/kg/día administrado cada 12 horas ó con mayor frecuencia. Inyección IV: dependiendo de la gravedad de la infección se puede administrar de 10 a 20 mg/kg/día en dosis divididas tal como se describe en la sección sobre tasa de dilución e infusión.

Tasa de dilución e infusión:

La dosis IV. se administra en base de 1 g de **Linco - Si** diluida en no menos de 100 ml de una solución adecuada e instalar por un periodo de no menos de una hora.

Dosis	Vol. de diluyente	Duración
600 mg	100 ml	1 Hora
1g	100 ml	1 Hora
2g	200 ml	2 Horas
3g	300 ml	3 Horas
4g	400 ml	4 Horas

Esta dosis pueden repetirse con la frecuencia requerida hasta el limite de la dosis diaria máxima recomendada de 8 gramos de Lincomicina

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 1 Frasco-ampolla de 1 ml y 2 ml

CONSERVACIÓN:

A temperatura entre 15-30°C.



Elaborado en República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L
Manos que inyectan **VIDA**