

PANTOPRAZOL

40 mg



Síntesis

POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE I.V

COMPOSICIÓN:

Cada Fco. Ampolla contiene:

Pantoprazol sódico.....46.56 mg
equivalente a 40 mg de pantoprazol.

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El Pantoprazol es un medicamento inhibidor de la bomba de protones en el estómago usado en el tratamiento a corto plazo de las erosiones y úlceras causadas por enfermedades de reflujo gastroesofágico. Indicada para el tratamiento de enfermedades en las que el organismo produce un exceso de ácido gástrico, como en el síndrome de Zollinger-Ellison. El Pantoprazol se absorbe rápida y totalmente, alcanzando su concentración máxima en suero después de la primera dosis, a los 15 minutos aproximadamente, disminuyendo la secreción ácida en 100 % en dos horas.

INDICACIONES:

Está indicado para el tratamiento de la esofagitis erosiva, asociada a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es efectivo en el tratamiento de las úlceras gástricas duodenales, en el tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison y de las úlceras inducidas por los antiinflamatorios no esteroideos incluyendo las producidas por *Helicobacter pylori* y otras enfermedades hipersecretoras patológicas.

CONTRAINDICACIONES:

El Pantoprazol está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad conocida al medicamento o a los benzimidazoles sustituidos tales como el Omeprazol, lansoprazol, posaconazol. Pantoprazol se debe utilizar con precaución en pacientes con disfunción hepática grave, si es necesario reajustar la dosis. Pantoprazol vía IV no está recomendado su uso en pacientes menores de 18 años.

EFFECTOS ADVERSOS:

El Pantoprazol puede ocasionar reacciones adversas. Debe Informarle a su médico si cualquiera de estos síntomas es grave o no desaparece: diarrea, dolor de cabeza, náusea, vómitos, flatulencia, dolor de articulaciones, estreñimiento, visión borrosa, vértigos, prurito, exantema cutáneo, trastornos del sueño y sequedad de boca.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

En pacientes con problemas graves de insuficiencia hepática durante el tratamiento con pantoprazol. El paciente puede presentar vértigos y trastornos de la visión, no deberá conducir o utilizar maquinarias. El médico le realizará un seguimiento más frecuente de las enzimas hepáticas, en el caso de un aumento de las enzimas hepáticas, el tratamiento deberá interrumpirse. Solo se recomienda vía IV, cuando la vía oral no es apropiada. Embarazo y Lactancia: Solamente debe emplearse en caso de fuerza mayor debido a que hasta ahora no hay experiencia sobre su empleo durante el embarazo y lactancia.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Las dosis terapéuticas en pantoprazol no tienen interacciones farmacocinéticas o farmacodinámicas clínicamente significativas con un amplio número de fármacos, que son sustrato de múltiples enzimas. El Pantoprazol no muestra interacciones significativas con los siguientes fármacos: antipirina, cafeína, carbamazepina, cisaprida, diazepam, fenitoína, warfarina o anticonceptivos orales, ketoconazol, itraconazol, posaconazol, sales de hierro y ampicilina. Pueden interferir con la absorción de esos medicamentos y otros cuya biodisponibilidad es determinada por pH gástrico. No se recomienda la administración conjunta de atazanavir y otros medicamentos para el tratamiento de VIH cuya absorción es pH - dependiente, con inhibidores de protones, el cual disminuye la biodisponibilidad de estos medicamentos de VIH y afecta la eficacia de los mismos.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN Ó INGESTA ACCIDENTAL:

En casos de una sobredosis los síntomas son: taquicardia leve, vasodilatación, somnolencia, confusión, cefalea, visión borrosa, dolor abdominal, náusea y vómitos. El **tratamiento** debe ser sintomático y de soporte, deberá llevarse un monitoreo cardiaco y de la presión sanguínea y así también del estado hidroelectrolítico.

MODO DE PREPARACIÓN:

El pantoprazol se recomienda con 10 o 100 ml de solución Na cl al 0.9 % o con glucosa al 5 %. La solución reconstituida debe utilizarse antes de las 12 horas siguientes a su preparado. La estabilidad física y química permanece dentro de las 12 horas a 25°C, microbiológicamente se recomienda utilizar de inmediato.

POSOLÓGIA:

Vía de administración: intravenosa

La dosis máxima intravenosa recomendada es de 40 mg por día. En caso más grave puede llegar hasta 80 mg dividida en dos dosis por día e igual para el tratamiento a largo plazo. En pacientes con insuficiencia hepática grave no debe exceder la dosis diaria de 20 mg. Tiempo máximo de administración de pantoprazol es de 7 días. Consulte siempre a su médico.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 1 y 100 Fco. ampollas con 40 mg de polvo.

CONSERVACIÓN:

Almacénese entre 15 y 30°C.



Elaborado en República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L
Manos que inyectan **VIDA**