

Tetracaína

0.5%

SOLUCIÓN OFTÁLMICA



Síntesis

Composición:

Cada ml contiene:

Tetracaína Clorhidrato5 mg
Agua destilada estéril c.s.p1 ml

Características generales:

La Tetracaína es un éter amino de acción prolongada, que produce anestesia al bloquear los canales de sodio de la membrana neuronal impide la generación y la conducción del impulso nervioso. Utilizado por multitud de profesionales de la salud a concentraciones suficientes para evitar temporalmente la sensibilidad en el lugar del cuerpo de su administración.

Indicaciones:

Para producir anestesia local de corta duración en procedimientos oftálmicos, incluyendo la medición de la presión intraocular (fonometría) la remoción de cuerpos extraños, suturas. Diagnóstico, gonioscopia. También en procesos quirúrgicos como la extracción de cataratas. Se usa conjuntamente con la anestesia local inyectada.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Está contraindicado cuando se requiere toma de muestras de córnea y conjuntiva para diagnóstico de queratoconjuntivitis o úlceras infecciosas.

Efectos adversos:

Prurito, ardor, irritación, hiperemia conjuntival, lagrimeo, edema (aumento del parpadeo), reacción de hipersensibilidad local.

Advertencias y Precauciones:

El uso prolongado puede producir queratitis severa, epitelio corneal, puede retrasar el tiempo de cicatrización al inhibir la mitosis. Proteja el ojo del polvo y la contaminación bacteriana hasta la recuperación completa. Este medicamento debe ser usado bajo vigilancia del médico tratante.

Interacciones medicamentosas:

Con las sulfonamidas disminuye la actividad microbiana.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación:

La sobredosificación o ingesta accidental raramente se presentan, ya que el medicamento es de uso exclusivo por el médico en el quirófano o consultorio.

Posología:

La dosis usual para producir una anestesia local tópica - aplicar en la conjuntiva ocular 1 o 2 gotas de la solución Tetracaína al 0.5%.
Adultos: Aplicar directamente en la conjuntiva una o dos gotas.
Niños: En niños no está contemplado su uso.

Presentación:

Caja conteniendo Frasco gotero de 10 ml.

Conservación:

Almacénese a temperatura entre 15 - 30°C.



Elaborado en República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L.
Manos que inyectan **VIDA**