

Fermal

Olopatadina Clorhidrato
0.2%

SOLUCIÓN OFTÁLMICA



Síntesis

COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:

Olopatadina2 mg
Agua destilada estéril c.s.p.1 ml

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Fermal (Olopatadina clorhidrato) es un agente antialérgico/antihistamínico potente, antagonista selectivo de los receptores H1, de la histamina, administrado en forma de colirio, indicado para el tratamiento de los signos y síntomas oculares asociados a la conjuntivitis alérgica estacional.

INDICACIONES:

Está indicado para la picazón ó comezón ocular, provocado por la conjuntivitis alérgica y así como los síntomas oculares asociados con padecimientos alérgicos.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al medicamento ó cualquiera de sus componentes. Está contraindicado en mujeres embarazadas ó en periodo de lactancia y niños menores de tres años.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Si se presenta reacciones graves ó hipersensibilidad al medicamento debe interrumpirse el tratamiento, aunque Fermal se absorbe a nivel sistémico, no existe riesgo para uso oftálmico. Está contraindicado en mujeres embarazadas ó en periodo de lactancia y niños menores de tres años. No es recomendable el uso de lentes de contacto durante el tratamiento, ni después de la aplicación de Fermal, por lo menos debe esperar 10 minutos antes de colocar los lentes. También en los casos de irritaciones relacionados con su uso.

EFECTOS ADVERSOS:

Las reacciones adversas más frecuentes: molestias oculares, prurito, edema de párpados, hiperemia, lagrimeo y queratitis, sequedad ocular, sensación de cuerpo extraño, otros síntomas como cefalea, náuseas, alteración del sentido del gusto (sequedad de la boca) rinitis, eritema, sinusitis, tos, dolor ocular.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Hasta el momento se desconoce interacciones medicamentosas con Fermal.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

En la sobredosificación puede presentar reacciones adversas. Tratamiento: Lavar con suficiente agua tibia corriente, en caso de continuar con las molestias consulte a su médico.

POSOLÓGIA:

Instilar una gota en el ojo afectado dos veces al día, ó según criteriomédico. Si se considera necesario el tratamiento puede mantenerse hasta un máximo de cuatro meses.

CONSERVACIÓN:

Consérvese a temperatura entre 15 - 30°C

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo Frasco gotero de 5 ml



Elaborado en la República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L
Manos que inyectan VIDA