

Vifazol - F

**Nafazolina 0.025%
+ Feniramina 0.3%**



SOLUCION OFTÁLMICA
Descongestivo - Antihistaminico

COMPOSICIÓN:

Cada ml contiene:

Nafazolina Clorhidrato.....	0.25 mg
Feniramina Maleato.....	3 mg
Vehiculo c.s.p.....	1 ml

GENERALIDADES:

Nafazolina F, un compuesto a base de Nafazolina descongestivo ocular. Adrenérgico que actúa produciendo vasoconstricción a nivel conjuntival y como consecuencia disminución de la congestión conjuntival. Con una duración de acción de 2-3 horas. La Feniramina que actúa aliviando la irritación ocular y la congestión en el tratamiento de estados alérgicos, Inflamatorios o infecciosos.

INDICACIONES:

Nafazolina F, solución oftálmica, está indicado para el alivio sintomático de la irritación conjuntival, congestión ocular, conjuntivitis alérgica, ojos lagrimosos y enrojecimientos por agentes externos, como la luz solar, así como para el alivio de la irritación ocular y la congestión en el tratamiento de estados alérgicos, inflamatorios o Infecciosos.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. En enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad ocular seria, hipotiroidismo. No se administre en niños menores de 12 años.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Extremar las precauciones en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado o predisposición a ella, ya que la midriasis producida podría precipitar bloqueo del ángulo. Ante la posibilidad de absorción sistémica, no debe indicarse indiscriminadamente en hipertensión, angina de pecho, insuficiencia coronaria, diabetes o hipertiroidismo. La ausencia de mejoría clínica a las 72 horas, aconseja la interrupción del tratamiento y la consulta del médico. Durante el embarazo: solo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. Se recomienda usar con precaución durante el periodo de lactancia, utilizando siempre dosis moderadas durante no más de 3 días. Uso en niños: se recomienda la utilización siempre a dosis moderadas durante no más de 3 días. Usos en ancianos: se debe tener en cuenta que estos pacientes son más propensos a padecer de ángulo cerrado no diagnosticado por lo que se recomienda precaución en su uso, utilizando siempre dosis moderadas durante no más de tres días.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Una absorción sistémica significativa de nafazolina oftálmica, el uso concomitante de maprotilina o antidepresivos tricíclicos puede potenciar el efecto presor de la Nafazolina.

EFFECTOS ADVERSOS:

Ocasionalmente pueden presentarse escozor, quemazón, visión borrosa. Excepcionalmente, signos de absorción sistémica: cefaleas, palpitations, nerviosismo, náuseas, debilidad, sudoración.

POSOLOGÍA: VÍA OFTÁLMICA

Instilar de 1-2 gotas en el saco conjuntival del ojo afectado, pudiendo repetirse hasta 3-4 veces/día.

NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN:

Para evitar la contaminación del producto, es importante impedir que el extremo del frasco entre en contacto con cualquier superficie, incluidos los ojos. Cerrar bien el frasco cuenta gotas inmediatamente después de su uso.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACIÓN O INGESTA ACCIDENTAL:

El uso prolongado puede ocasionar efecto rebote. La sobredosis o la administración accidental por vía oral puede ocasionar depresión del S.N. C. con reducción de la temperatura corporal y síntomas de bradicardia, sudoración, somnolencia y coma, particularmente en niños.

ADVERTENCIA:

ÚSESE POR PRESCRIPCIÓN MÉDICA
MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRESENTACIÓN:

Caja con Frasco gotero de 15 ml

CONSERVACIÓN:

Conserve en lugar fresco y seco a temperatura entre 15° y 30 °C



Elaborado en República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L
Manos que inyectan **VIDA**