

Micoftal D

**Moxifloxacina HCL
+ Dexametasona F. Sódico**



SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL

Composición:

Cada ml contiene:

Moxifloxacina HCL.....	5 mg
Dexametasona F. sódico.....	1 mg
Agua destilada estéril c.s.p.....	1 ml

Características generales:

La combinación de moxifloxacina y Dexametasona, un antibiótico y un antiinflamatorio. El antibiótico posee gram actividad bactericida en contra de la mayoría de las cepas aerobias gram positivo, el antiinflamatorio potente e inmunosupresor de acción de larga duración. La combinación tópica de un agente antibacterial y un antiinflamatorio es eficaz para la cirugía ocular, el antibiótico contra la proliferación de las bacterias y el antiinflamatorio suprime la inflamación.

Indicaciones:

Está indicado en el tratamiento de infecciones oculares causadas por microorganismos susceptibles y en la prevención de la inflamación e infección bacteriana que puede ocurrir tras la cirugía ocular.

Contraindicaciones:

Está contraindicado en pacientes con Hipersensibilidad a la fórmula o algunos de sus componentes, derivados quinolónicos, infecciones oculares por micobacterias, enfermedades micóticas oculares, glaucoma, enfermedades con adelgazamiento de la córnea y la esclera, queratitis epitelial por herpes simples (queratitis dendrítica), vaccinia, varicela, enfermedades virales de la córnea y de la conjuntiva.

Efectos adversos:

Las reacciones que pueden presentarse son: glaucoma, catarata, infecciones oculares secundarias, formación de defectos visuales, conjuntivitis, sequedad ocular, inflamación de la córnea, molestia ocular, enrojecimiento ocular, dolor ocular, prurito ocular, hemorragia subconjuntival, lagrimeo, fiebre, aumento de tos, infección, otitis media y faringitis.

Advertencias y Precauciones:

En caso de reacción alérgica a este producto, se deberá interrumpir su uso y aplicar las medidas de lugar; el uso prolongado de esteroides puede causar hipertensión ocular y/o glaucoma, con daño al nervio óptico, alteración de la agudeza y del campo visual, formación de catarata subcapsular posterior; también se puede desarrollar súper infección, y afinamiento corneal o de la esclerótica. Se han presentado casos de perforación con el uso de esteroides tópicos; en condiciones de infecciones agudas, el empleo de esteroides puede enmascarar la infección o agravarla.

Interacciones medicamentosas:

Hasta el momento se desconocen interacciones medicamentosas con la moxifloxacina, pero los corticosteroides pueden potenciar los efectos de los antidepresivos, no se recomienda usar otros oftálmicos, esto podría afectar su acción farmacológica.

Manifestaciones y manejo de la sobredosisión ó ingesta accidental:

En caso de sobredosis, lavar con abundante agua tibia en cada ojo afectado. No administrar medicamentos en las primeras horas. En caso de ingesta accidental mantener en observación al paciente, si se presentan alguno síntomas especial realizar el tratamiento de lugar.

Posología:

Vía de administración: Oftálmica

Instilar 1 gota en el ojo afectado 4 veces al día en prevención de infección e inflamación ocular postquirúrgica. Para queratitis, blefaritis, conjuntivitis y úlceras corneales Instilar 1-2 gotas en cada ojo, en un período de tiempo de 2-4 horas.

Presentación:

Caja conteniendo Frasco gotero de 5 ml

Conservación:

Almacénese a temperatura entre 15 y 30°C



Elaborado en República Dominicana por:
Laboratorio Síntesis, S.R.L
Manos que inyectan **VIDA**

Ultima Revisión 20-11-2016