

Micoftal

Moxifloxacin HCL



SOLUCIÓN OFTÁLMICA ESTÉRIL

Composición:

Cada ml contiene:

Moxifloxacin HCL.....5 mg
Agua destilada estéril c.s.p.....1 ml

Características generales:

La Moxifloxacin es una fluoroquinolona de 4ta generaci3n, que inhibe la ADN girasa y la topoisomerasa para la replicaci3n, reparaci3n y recombinaci3n del ADN bacteriano, antibi3tico de gran actividad bacteriana contra cepas aerobias gram positivas y gram negativas.

Indicaciones:

Está indicado para el tratamiento de la conjuntivitis bacteriana provocada por cepas susceptibles de los Microorganismos aerobios Gram-positivos y Gram-negativos, y otros microorganismos como: Chlamydia trachomatis.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a la fórmula o algunos de sus componentes u otras quinolonas.

Efectos adversos:

Los efectos más frecuentes: Conjuntivitis, disminuci3n de la agudeza visual, sequedad ocular, queratitis, hiperemia, dolor, prurito, hemorragia subconjuntival y lagrimeo. Otros efectos adversos que no guardan relaci3n con la soluci3n oftálmica como: fiebre, tos incrementada, infecci3n, otitis media, faringitis, rash y rinitis.

Advertencias y Precauciones:

No se recomienda para la profilaxis o tratamiento empírico de la conjuntivitis gonocócica, ni la oftalmía neonatal gonocócica, debido a la prevalencia de Neisseria gonorrhoeae resistente a fluoroquinolonas. Se debe advertir a los pacientes que no usen lentes de contacto si presentan signos y síntomas de infecci3n ocular bacteriana.

En mujeres embarazadas o lactando: Se recomienda utilizar con precauci3n. Después de la administraci3n de Micoftal (Moxifloxacin) puede aparecer visi3n borrosa transitoria y otras alteraciones visuales, que puede afectar la capacidad para conducir o utilizar máquinas. Si se produce una reacci3n alérgica a la moxifloxacin, se debe interrumpir el uso de este medicamento. El uso prolongado puede producir infecci3n, se recomienda interrumpir el uso e instaurar el tratamiento adecuado.

Interacciones medicamentosas:

Hasta el momento no tenemos informaci3n de interacci3n con moxifloxacin dada la baja concentraci3n sistémica.

Manifestaciones y manejo de la sobredosis o ingesta accidental:

En caso de sobredosis lavar con suficiente agua tibia en cada ojo afectado. En caso de una ingesta accidental mantener en observaci3n al paciente, si se presentan algunos síntomas especiales realizar el tratamiento que amerite el caso.

Posología:

Vía de administraci3n: Oftálmica

Instilar una gota en cada ojo afectado 3 veces al día por 5 días. En caso que la infecci3n no ceda consulte a su médico para evaluar el tratamiento.

Si se emplea más de un medicamento por vía oftálmica, las aplicaciones deben espaciarse al menos 5 minutos antes de la aplicaci3n.

Presentaci3n:

Caja conteniendo Frasco gotero de 5 ml

Conservaci3n:

Almacénese a temperatura entre 15 y 30°C



Elaborado en República Dominicana por:
Laboratorio Síntesis, S.R.L
Manos que inyectan **VIDA**