

Prednisolona

1%

SUSPENSIÓN OFTÁLMICA



Síntesis

Composición:

Cada ml contiene:

Prednisolona, Acetato..... 10 mg

Vehículo c.s.p..... 1 ml

Generalidades:

La prednisolona al 1% es una suspensión estéril de acetato de prednisolona cuya acción farmacológica lo define como antialérgico - antiinflamatorio oftálmico. Se usa en procesos alérgicos e inflamatorios del segmento anterior del ojo; uveítis anterior y posterior, acné rosácea, herpes zóster oftálmico, queratitis, en algunas conjuntivitis alérgicas, glaucoma secundario ó inflamación uveal anterior.

Indicaciones:

En todo tipo de proceso infeccioso que curse con cuadro inflamatorio agudo del tipo de: Blefaritis, conjuntivitis, queratitis, dacriocistitis aguda, blefaro conjuntivitis y algunas querato conjuntivitis y postoperatorio de cirugía ocular.

Contraindicaciones:

En personas hipersensibles a corticoides; glaucoma de cualquier tipo, personas con antecedentes heredofamiliares de glaucoma, procesos oculares de tipo micótico, y de origen desconocido. Infecciones purulentas no tratadas, herpes simple, tuberculosis ocular.

Efectos adversos:

El uso prolongado puede ocasionar súper infecciones e hipertensión intraocular con posible aparición de glaucoma, formación de catarata subcapsular posterior.

Advertencias y Precauciones:

Puede ocasionar retraso en la cicatrización de las heridas, infecciones oculares secundarias por virus u hongos liberados de los tejidos. Se recomienda utilizar con precaución durante el embarazo y la lactancia.

Interacciones Medicamentosas:

Los esteroides disminuyen la acción de los antibióticos, pero esto puede evitarse aumentando la dosis de los antibióticos. Los anestésicos tópicos pueden aumentar la absorción de las drogas tópicas y favorecer la aparición de los efectos adversos.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental:

En caso de sobredosificación tópica pueden aparecer efectos adversos y se debe suspender la administración del medicamento. Si ocurre ingesta accidental administre líquidos orales para diluirlo.

Posología:

1 a 2 gotas instiladas en el saco conjuntival, dos o cuatro veces al día. Durante las primeras 24 a 48 horas la dosis puede ser aumentada sin riesgos a 2 gotas cada hora, según criterio médico. Agite antes de usar.

Presentación:

Caja conteniendo Frasco gotero de 5 ml

Conservación:

A temperatura entre 15 y 30 °C



Elaborado en República Dominicana por:
Laboratorio Síntesis, S.R.L
Manos que inyectan **VIDA**