

Diclofenac

0.1%

SOLUCIÓN OFTÁLMICA



Síntesis

Composición:

Cada ml contiene:

Diclofenac Sódico1 mg

Agua Destilada Estéril c.s.p.1 ml

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

El Diclofenac es un fármaco antiinflamatorio no esteroide con características de polaridad que le confieren una buena difusión en los tejidos y una elevada actividad antiinflamatoria en el lugar de la aplicación. Esta sustancia no esteroide derivada del ácido fenilacético, es analgésica y antiinflamatoria. Se administra antes de la cirugía, e inhibe la miosis. Eficaz en el alivio de procesos antiinflamatorios. Disminuye la incidencia del edema macular cistoide (acumulación de líquido en la zona más sensible de la retina).

INDICACIONES:

Indicado en el Tratamiento de la inflamación ocular, para reducir la inflamación postoperatoria (cirugía de cataratas). Conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales e inflamación post-traumática de córnea o conjuntiva no asociadas a infección ocular.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Está contraindicado en pacientes en los cuales los antiinflamatorios no esteroideos hayan producido ataque de asma, herpes simple, rinitis alérgica, queratitis activa, sensibilidad a este tipo de medicamentos. Está contraindicado en niños menores de 3 años.

EFFECTOS ADVERSOS:

Los efectos adversos de este medicamento son leves y transitorios. Puede presentarse sensación de irritación ocular, ardor, lagrimeo, visión borrosa. Reacciones de hipersensibilidad con prurito, enrojecimiento y fotosensibilidad. Ante cualquier reacción adversa deberá interrumpirse la medicación.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Se recomienda usar con precaución en pacientes quirúrgicos con tendencia conocida a hemorragia por afecciones de coagulación, ó en pacientes que han recibido medicamentos que puedan prolongar el tiempo de coagulación, en pacientes con daños traumáticos con hemorragia. No deberá usarse lentes de contacto durante la aplicación del medicamento, pero puede colocarlos después de 15 minutos de su administración. No tocar ninguna superficie con la punta del gotero para evitar contaminación. Embarazo y lactancia: es aconsejable utilizar el producto solo en casos de absoluta necesidad y bajo estricto control médico. Se aconseja evitar el medicamento durante la conducción de vehiculos ó el uso de maquinaria.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No se han descrito interacciones medicamentosas con el diclofenac oftálmico.

MANIFESTACIONES Y MANEJO DE LA SOBREDOSIFICACION O INGESTA ACCIDENTAL:

Dada la forma farmacéutica y su vía de administración, es difícil la aparición de sobredosificación.

POSOLÓGIA:

Adultos: Tratamiento de la inflamación post-quirúrgica 1 gota en el ojo afectado 4 veces al día, empezando a las 24 horas post-quirúrgica y continuarlo en la siguientes dos semanas. Tratamiento de la conjuntivitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales : tópico para la conjuntiva, una

gota en el ojo afectado 4 ó 5 veces al día dependiendo de la severidad. Prevención de la reducción de la miosis intraoperatoria: Tópico para la conjuntiva, 1 gota en el ojo afectado, aplicada 5 veces durante las 3 horas previas a la cirugía y a los 15, 30 y 45 minutos del preoperatorio. Dosis pediátrica: No se ha establecido.

Presentación:

Caja con Frasco Gotero de 5 ml

Conservación:

Almacénese a temperatura entre 15°C y 30°C.



Elaborado en la República Dominicana por:

Laboratorios Síntesis, S.R.L

Manos que inyectan VIDA