

Vifazol

Nafazolina

SOLUCIÓN OFTÁLMICA



Síntesis

Composición:

Cada ml contiene:

Clorhidrato de Nafazolina.....0.001 g
Agua Destilada c.s.p.1 ml

Características generales:

Vifazol (Nafazolina) es un fármaco simpaticomimético, pertenece al grupo imidazolinico. Su efecto se traduce en vasoconstricción del sistema vascular de la conjuntiva, debido a la acción directa sobre los receptores del músculo liso vascular. La acción ejercida sobre receptores alfa adrenérgicos de la conjuntiva da como consecuencia la disminución de la congestión conjuntival como es la irritación e inflamación del ojo.

Indicaciones:

Vifazol, está indicado para el alivio sintomático de la irritación conjuntival, congestión ocular, conjuntivitis alérgica, ojos lagrimosos y enrojecidos por agentes externos, como luz solar, uso lentes de contacto y cualquier otra condición que ocasione irritación ocular leve.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a algunos de los componentes de la fórmula y/o alergia al medicamento. Está contraindicado en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho, excepto bajo vigilancia médica. No debe administrarse conjuntamente con inhibidores de la MAO, ya que los pacientes pueden experimentar una severa crisis hipertensiva.

Efectos adversos:

Ocasionalmente, escozor, quemazón, visión borrosa. Con el uso excesivo o dosis elevadas pueden ocurrir congestión de rebote (enrojecimiento e irritación de la conjuntiva), hiperemia reactiva y algunos signos de absorción. Cefaleas, palpitaciones, nerviosismo, náuseas, debilidad y sudoración.

Advertencias y Precauciones:

Extremar las precauciones en pacientes con glaucoma de ángulo cerrado o predisposición a ella, ya que la midriasis producida podría precipitar bloqueo del ángulo. Ante la posibilidad de absorción sistémica, no debe indicarse indiscriminadamente en hipertensión, angina de pecho, insuficiencia coronaria, diabetes o hipertiroidismo. La ausencia de mejoría clínica a las 72 horas, aconseja la interrupción del tratamiento y consulta al médico. Uso durante el embarazo: solo se acepta en caso de ausencia de alternativas terapéuticas más seguras. Uso durante la lactancia y en niños: se recomienda precaución, utilizando siempre dosis moderadas durante no más de 3 días.

Interacciones medicamentosas

El empleo concomitante de antidepresivos tricíclicos o inhibidores de la MAO pueden potenciar el efecto presor de la nafazolina. El uso simultáneo con la benzodiazepina, barbitúricos y/o consumo de alcohol produce potenciación de la depresión del S.N.C.

Manifestaciones y manejo de la sobredosis ó ingesta accidental:

Los síntomas de una sobredosis corresponden a reacciones adversas tales como disminución de la temperatura corporal, somnolencia, latidos cardiacos lentos, debilidad severa. El **tratamiento** si se ingiere accidentalmente: Adminístrese líquidos orales para diluir el producto, siempre con medida de apoyo.

Posología:

Instilar 2-3 gotas en el saco conjuntival del ojo afectado, de 3-4 veces/día.

Presentación:

Caja con Frasco gotero de 15 ml

Conservación:

Almacénese a temperatura entre 15 y 30°C.



Elaborado en República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L
Manos que inyectan **VIDA**