

Diazepan

10 mg / 2 ml



Síntesis

SOLUCION INYECTABLE IM. / IV.

COMPOSICIÓN:

Cada ampolla contiene:

Diazepan.....10 mg
Vehículo c.s.p..... 2 ml

GENERALIDADES:

Diazepan pertenece al grupo de los tranquilizantes benzodiazepínicos, sustancias que tienen propiedades ansiolíticas y antineuríticas, psicosedativas y antiagresivas, sedantes, miorelajantes (del músculo estriado y uterino), anticonvulsivantes y potencializador de hipnóticos, analgésicos. El Diazepan actúa sobre el sistema nervioso central, su inhibición selectiva puede constituir parte esencial del efecto terapéutico.

INDICACIONES:

En alteraciones neurovegetativas funcionales, para aliviar estados de ansiedad, tensión, excitación, agitación o insomnio. Neurosis, psicopatías y psicosis en psiquiatría. Espasmos musculares. Como sedación en intervenciones de diagnósticos y terapéuticos, en tratamientos anticonvulsivantes del epiléptico y el tétanos. En eclampsia y para facilitar el trabajo del parto. En síntomas de abstinencia alcohólica.

CONTRAINDICACIONES:

No tiene contraindicación absoluta. Pueden darse relativamente miastenia gavis, insuficiencia hepática grave y estados de depresión respiratoria, coma, shock y cualquier condición preexistente de depresión del SNC, glaucoma de ángulo estrecho, primer trimestre del embarazo, hipotermia muscular, intoxicación alcohólica aguda. Evitar conducir u operar maquinarias mientras esté bajo los efectos del medicamento.

EFFECTOS SECUNDARIOS:

Puede deprimir el centro respiratorio, somnolencia, confusión, fatiga, disartría. Vértigo y debilidad muscular. En personas de edad avanzada puede presentarse ataxia e hipertensión ligera, alteraciones de la memoria, sequedad en la boca, náusea y constipación, trastornos hemáticos. Apnea, sudación, erupción cutánea, visión doble o borrosa, hipotensión y bradicardia, disminución de la libido, calambres musculares.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Los pacientes bajo tratamiento no deben ingerir bebidas alcohólicas, ya que su capacidad de reacción merma. En pacientes con antecedentes de alcoholismo o drogadicción la disminución de la acción del Diazepan es mayor. Utilizar con cuidado en pacientes con depresores del SNC, pacientes con niveles de albúmina, en ancianos y niños pequeños. Reducir la dosis al 50% en pacientes con cirrosis.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

El uso simultáneo con el alcohol potencia los efectos sedantes del Diazepan. La asociación del Diazepan con antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos / sedantes, antidepressivos, analgésicos narcóticos, antiepilépticos, anestésicos y sedantes antihistamínicos, puede manifestarse una intensificación del efecto depresor central. Existe una interacción significativa con Cimetidina, Ketoconazol, Fluvoxamina, Fluoxetina y Omeprazol, que modifican su farmacocinética y puede conducir a una sedación mayor y prolongada del Diazepan. La fenitoína sufre una eliminación metabólica influida por el Diazepan.

SOBREDOSIFICACIÓN:

La sobredosificación se manifiesta con depresión del sistema nervioso central con síntomas que van desde somnolencia hasta el coma. En los casos leves son somnolencia, confusión mental y letargo. En casos más graves los síntomas observados ataxia, hipotensión, depresión respiratoria. Tratamiento: en la unidad de terapia intensiva debe presentarse especial atención al mantenimiento de las funciones respiratoria y cardíaca. Utilizar un eficaz antagonista.

POSOLÓGIA:

Según indicación médica.

Vía de Administración: Intramuscular, Intravenosa.

Niños de 2-5 mg; Adultos 20 mg a intervalos de 1 a 8 horas, según necesidad, Por vía I.V. (inyección o perfusión), I.M.

Espasmos musculares: 10 mg, 1 a 2 veces al comienzo del tratamiento.

Dosis usual en adultos 10 a 20 mg, tres veces al día por vía I.V. o I.M.

dependiendo de la necesidad.

PRESENTACIÓN:

Caja conteniendo 3 y 100 ampollas de 2 ml.

CONSERVACIÓN:

Manténgase a temperatura entre 15° y 30 °C.



Elaborado en República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L.
Manos que inyectan **VIDA**