

Haloperidol

5 mg / ml



Síntesis

SOLUCIÓN INYECTABLE IM. / IV.

Composición:

Cada ampolla contiene:

Haloperidol lactato 5mg
Vehículo c.s.p. 1ml

Características generales:

El Haloperidol es un neuroléptico que pertenece al grupo de las butirofenonas. Es un potente antagonista central de los receptores dopaminérgicos y, por tanto, se le clasifica dentro de los neurolépticos mayores. Como consecuencia directa de su efecto bloqueador dopaminérgico central, tiene una actividad antipsicótica con la efectividad en los trastornos esquizofrénicos y otros trastornos psicóticos.

Indicaciones:

En el tratamiento de la esquizofrenia aguda y crónica, de la enfermedad maniaco-depresiva en su fase maniaca. Como tranquilizante en estados de excitación psicomotora, delirio hipocondríaco, trastornos de personalidad: Obsesiva-compulsiva, paranoide, histriónica, agitación, agresividad, hipo persistente, tics, tartamudeo y sus síntomas, trastornos de la conducta y el carácter en niños.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad al Haloperidol o a algunos de los componentes, estado comatoso, Depresión del S.N.C. producida por el alcohol u otros medicamentos depresores. Enfermedad de Parkinson, lesión de los ganglios basales. No administrar durante la lactancia, pues pasa a la leche materna.

Efectos adversos:

Puede ocasionar manifestaciones extrapiramidales, hipotensión y taquicardia, galactorrea, insomnio, agitación, hiperkinesia, cefalea. Trastorno psicótico, depresión, aumento de peso, hipotensión ortostática y somnolencia.

Advertencias y Precauciones:

Usar con precaución durante el primer trimestre de embarazo, y asociado a drogas anticonvulsivantes. En caso de hipotensión, no usar epinefrina como vasopresor. Se aconseja a los pacientes que no conduzcan o manipulen maquinaria durante el tratamiento con Haloperidol, por posible aparición de somnolencia, mareo, disminución de la capacidad mental y la actividad reflejo. Haloperidol solo deberá ser usado durante el embarazo cuando el beneficio potencial justifique el posible riesgo para el feto y lactantes.

Interacciones medicamentosas:

Las principales interacciones con las drogas antimaníacas, es la aparición de un cuadro de encefalopatía por el uso concomitante de sales de litio y Haloperidol, con aparición de confusión mental, fiebre, estupor y trastornos extrapiramidales. Estimulantes centrales, existe antagonismo entre el Haloperidol y la anfetamina. Antidepresivos tricíclicos, al parecer el Haloperidol es capaz de inhibir el metabolismo de dichos compuestos con aumento de acción de los mismos. Fármacos depresores del S.N.C. el Haloperidol puede potenciar los efectos de otros depresores del S.N.C., como opiáceos, barbitúricos, anestésicos, alcohol, hipnóticos, sedantes o analgésicos potentes.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación o ingesta accidental:

Los síntomas de la sobredosis son un aumento de los efectos adversos. Los síntomas: Reacciones extrapiramidales severas, hipotensión o sedación, rigidez muscular y temblor generalizado o localizado. El paciente puede parecer comatoso con depresión respiratoria e hipotensión, lo que puede ser severo como para producir un estado semejante al shock. Se considera el riesgo de arritmias ventriculares. **Tratamiento:** Sintomático, establecer una vía aérea permeable. Respiración mecánica, contrarrestar la hipotensión y el colapso respiratorio y vasopresores. La diálisis no es eficaz para eliminar el exceso Haloperidol sistemático.

Posología:

Según prescripción médica.

Vía Intravenosa o Intramuscular. La dosis requerida por cada paciente es muy variable, la dosis debe individualizarse de acuerdo con las necesidades y la respuesta de cada paciente. Dosis inicial 2.5 a 5 mg dos o tres veces al día. Síntomas severos y / o trastornos más crónicos la dosis de 5 a 10 mg, una o dos veces al día.

Presentación:

Caja conteniendo 3 y 100 ampollas de 1 ml

Conservación:

Almacénese en lugar fresco y seco a temperatura entre 15° y 30°C



Elaborado en la República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L.
Manos que inyectan **VIDA**