

Ergonovina

0.2 mg / ml

SOLUCIÓN INYECTABLE IM. / IV.



Síntesis

Composición:

Cada Ampolla contiene:

Maleato de Ergonovina.....	0.2 mg
Agua para inyección c.s.p.	1 ml

Características generales:

El Maleato de Ergonovina es un potente y específico agente uterotónico, que actúa directamente sobre el músculo liso del útero e incrementa el tono basal, la frecuencia y la amplitud de las concentraciones rítmicas. La Ergonovina es un medicamento oxitócico para el manejo activo de la tercera etapa del parto. Se usa para el tratamiento de la atonía / hemorragia uterina, que ocurre durante y después de la tercera etapa del parto, en asociación con la cesárea o después de un aborto.

Indicaciones:

La Ergonovina está indicada para la profilaxis o el tratamiento de la hemorragia uterina post parto y post aborto, debido a atonía uterina.

Contraindicaciones:

Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Durante el embarazo, arteriosclerosis avanzada, arteritis obliterante. En las infecciones hepáticas, estados febriles y en enfermedades vasculares (hipertensión severa), incluida toxemia gravídica, hipocalcemia, cardiopatía coronaria, disfunción renal y sepsis. El Maleato de Ergonovina está contraindicado en la inducción del trabajo de parto y en casos de aborto espontáneo inminente. El Maleato de Ergonovina no debe ser administrado a los pacientes que han presentado reacciones alérgicas o idiosincrasia al medicamento.

Efectos adversos:

Puede presentarse diversas manifestaciones por lo que debe utilizarse este medicamento con precaución. Puede ocasionar náuseas, vómito, diarrea, mareos, cefalea, congestión nasal, sudoración, aunque es raro, en algunos casos puede elevarse la presión arterial de la paciente y presentar bradicardia, vasoespasmo coronario. Estas elevaciones de la presión arterial no son más frecuentes con el Maleato de Ergonovina que con otros oxitócicos. El uso de Maleato de Ergonovina después del parto se ha asociado, en casos raros, con infarto del miocardio.

Advertencias y Precauciones:

No se recomienda el uso rutinario de la Ergonovina antes de que se haya expulsado la placenta. Debe administrarse con cautela en pacientes con enfermedad cardíaca o hipertensión arterial, deben vigilarse el pulso y la respuesta uterina, los cambios súbitos en los signos vitales o los periodos frecuentes de relajación uterina. Debe evitarse el uso prolongado.

Interacciones medicamentosas:

El uso de manera simultánea de fármacos vasoconstrictores, vasopresores y otros alcaloides del cornezuelo de centeno con Ergonovina pueden potenciar la vasoconstricción de la misma, entre ellos:

Saquinavir y delavirdina: Se presenta ergotismo náusea, vómito, isquemia vasoespástica).

Dinoprostona: Aumenta el riesgo de toxicidad oxitócica. Antibióticos macrólidos, dopamina: Gangrena de extremidades, evitar la combinación; si no, vigilar datos de vasoconstricción excesiva (frío, palidez, dolor); sobre todo en extremidades.

Anestésicos generales: Como Halotano interfiere con la acción oxitócica produciendo una severa hemorragia uterina.

Manifestaciones y manejo de la sobredosificación ó ingesta accidental:

La sobredosis se caracteriza por lo siguiente: Sobredosis aguda: angina, bradicardia, confusión, somnolencia, pulso rápido y fuerte, miosis, vasoconstricción periférica severa, depresión respiratoria, convulsiones, taquicardia, inconsciencia, sed inusual y tetania uterina. Sobredosis crónica: gangrena, hemiplejía y tromboflebitis. El tratamiento es básicamente de soporte y sintomático, suspender inmediatamente el Maleato de Ergonovina, en caso de ingesta para disminuir la absorción: se puede usar dosis múltiple de carbón activado y un catártico apropiado.

Posología:

La dosis habitual, intramuscular (o intravenosa en emergencias) del Maleato de Ergonovina es de 0.2 mg (1 ampolla). En casos de sangrado uterino grave pueden necesitarse dosis repetidas, pero rara vez se requerirán inyecciones con frecuencia mayor a una cada 2 ó 4 horas. Siempre tomando en consideración el criterio médico. La administración intravenosa produce una respuesta más rápida. Sin embargo, debido a la mayor incidencia de náusea y otros efectos colaterales, se recomienda que se restrinja la vía intravenosa a casos de emergencia, tales como sangrado uterino excesivo.

Presentación:

Caja conteniendo 3 y 100 ampollas de 1 ml

Conservación:

Almacénese a temperatura entre 15 y 30°C.



Elaborado en la República Dominicana por:
Laboratorios Síntesis, S.R.L
Manos que inyectan VIDA